

OxOral®

Gel Antiséptico Bucal



OxOral® Gel Antiséptico Bucal

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

Gel a base de Solución Electrolizada de Superoxidación con pH Neutro.

DESCRIPCIÓN: Oxoral® Gel Antiséptico Bucal, gel a base de solución electrolizada de superoxidación auxiliar en tratamientos odontológicos.

ESPECTRO ANTIMICROBIANO: Laboratorios autorizados por la Secretaría de Salud han demostrado in vitro el amplio espectro antimicrobiano (bactericida, virucida y fungicida) de Oxoral® Gel Antiséptico Bucal, efecto también confirmado en la práctica clínica.

MECANISMO DE ACCIÓN: Oxoral® Gel Antiséptico Bucal contiene como ingrediente activo especies activas de cloro y oxígeno, así como elevado potencial REDOX (ORP). Inactiva virus por desnaturalización de componentes estructurales de envolturas y cápsidas. En contacto con bacterias y hongos, induce daño oxidante al depredar electrones de sus estructuras externas, causando ruptura de enlaces químicos, extravasado del contenido intracelular y lisis osmótica, produciendo desequilibrio en los procesos vitales del microorganismo y su eliminación. Adicionalmente, controla la inflamación local asociada a infección y estimula la proliferación y quimiotaxis de fibroblastos al sitio de la lesión, favoreciendo la regeneración tisular.

La formulación de Oxoral® Gel Antiséptico Bucal asegura actividad biocida controlada, siendo inocuo para los tejidos de la anatomía humana. Su textura y consistencia favorecen la hemostasia en heridas sin sangrado profuso.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Oxoral® Gel Antiséptico Bucal de amplio espectro, elimina virus, bacterias y hongos, está indicado:

- Posterior a extracciones múltiples y previo a la colocación de prótesis inmediata.

- Procesos de cirugía maxilofacial y alteraciones de mucosa por aparatología ortodóntica.
- Tratamiento de lesiones que se presentan en mucosas y encías.
- Auxiliar en gingivitis y periodontitis.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Los datos de seguridad y práctica clínica no han mostrado indicios de efectos dañinos en la madre o bebé cuando Oxoral® Gel Antiséptico Bucal es administrado en forma tópica durante el embarazo, debido a que no se absorbe.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Hasta la fecha no se han reportado reacciones secundarias y adversas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: En cirugía Maxilofacial aplicar Oxoral® Gel Antiséptico Bucal a través de jeringa hipodérmica y capuchón plástico del punzocat directamente en la zona tratada. Aplicar Oxoral® Gel Antiséptico Bucal directamente en la lesión bucal, las veces que considere necesario o según la indicación del odontólogo.

PRECAUCIONES GENERALES: No se deje al alcance de los niños. Protéjase de la luz solar. Manténgase en lugar fresco y seco.

PRESENTACIONES: Caja con tubo con 28 g con punta para fácil aplicación.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente, no debe exponerse directamente a la luz solar.

Reg. Núm. 0794C2019 SSA

DOBLE ACCIÓN
MÁXIMA PROTECCIÓN

